

GENERIC EYE DROPS

	Sat	Sun	Mon	Tues	Wed	Thurs	Fri	Sat	Sun
Ofloxacin	○ ○ ○ ○	○ ○ ○ ○	○ ○ ○ ○	○ ○ ○ ○	○ ○ ○ ○	○ ○ ○ ○	○ ○ ○ ○	○ ○ ○ ○	○ ○ ○ ○
Ketorolac	○ ○ ○ ○	○ ○ ○ ○	○ ○ ○ ○	○ ○ ○ ○	○ ○ ○ ○	○ ○ ○ ○	○ ○ ○ ○	○ ○ ○ ○	○ ○ ○ ○
Prednisolone	○ ○ ○ ○	○ ○ ○ ○	○ ○ ○ ○	○ ○ ○ ○	○ ○ ○ ○	○ ○ ○ ○	○ ○ ○ ○	○ ○ ○ ○	○ ○ ○ ○

2nd Week			Mon	Tues	Wed	Thurs	Fri	Sat	Sun
Ketorolac			○ ○ ○ ○	○ ○ ○ ○	○ ○ ○ ○	○ ○ ○ ○	○ ○ ○ ○	○ ○ ○ ○	○ ○ ○ ○
Prednisolone			○ ○ ○ ○	○ ○ ○ ○	○ ○ ○ ○	○ ○ ○ ○	○ ○ ○ ○	○ ○ ○ ○	○ ○ ○ ○

3rd Week			Mon	Tues	Wed	Thurs	Fri	Sat	Sun
Ketorolac			○ ○ ○ ○	○ ○ ○ ○	○ ○ ○ ○	○ ○ ○ ○	○ ○ ○ ○	○ ○ ○ ○	○ ○ ○ ○
Prednisolone			○ ○ ○ ○	○ ○ ○ ○	○ ○ ○ ○	○ ○ ○ ○	○ ○ ○ ○	○ ○ ○ ○	○ ○ ○ ○

4th Week			Mon	Tues	Wed	Thurs	Fri	Sat	Sun
Ketorolac			○ ○ ○ ○	○ ○ ○ ○	○ ○ ○ ○	○ ○ ○ ○	○ ○ ○ ○	○ ○ ○ ○	○ ○ ○ ○
Prednisolone			○ ○ ○ ○	○ ○ ○ ○	○ ○ ○ ○	○ ○ ○ ○	○ ○ ○ ○	○ ○ ○ ○	○ ○ ○ ○

(Fill in circles after you instill your drops) ●

Take all drops **breakfast, lunch, dinner and bedtime**

Techniques for placing eyedrops in eye

1. Lie flat on a couch or bed
2. Pull the lower eyelid down in the center to make a larger target
3. Hold the bottle 2" above the eye and place the eyedrop in the pocket of the lower eyelid
4. Close the eye without blinking for 30 seconds to let the drop absorb
5. Wait at least 5 minutes between eyedrops.

A prescription for Vigamox, Durezol, and Prolensa or Ilevro will be sent to your pharmacy the Thursday before your surgery.